

2種混合（破傷風・ジフテリア）定期予防接種のお知らせ

予防接種法に基づく定期予防接種を実施します。予防接種はお子さんを病気から守るため、また周りへの感染症の拡大を防ぐために必要なものです。予防接種の目的や内容をよく理解した上で、お子さんの体調の良いときに受けましょう。

- 1 対象年齢 1 1 歳以上 1 3 歳未満（1 3 歳の誕生日の前日まで）
- 2 接種回数 1 回
- 3 接種場所 別紙「予防接種協力医療機関」2 種混合の欄に○印のある医療機関
※医療機関に予約をしてから接種してください。
- 4 持 ち 物 予防接種予診票（伊那市発行のもの）・母子健康手帳
- 5 費 用 無料（公費負担）※対象年齢を過ぎると実費になります。



◎ワクチンの効果

4 種混合（百日せき・破傷風・ジフテリア・ポリオ）1 期の免疫効果を持続させるために、2 種混合ワクチンを接種します。

◎予防する病気

ジフテリア	ジフテリア菌は、咳などに含まれ、鼻やのどから感染します。症状は、発熱、のどの痛みなどで始まり、のどに白い膜ができたり首のリンパ節が腫れたりします。ジフテリア菌の毒素が心臓の筋肉や神経に作用することで、心不全や呼吸に必要な筋肉に麻痺などをきたし、重篤になる場合や亡くなってしまうこともあります。
破傷風	破傷風菌は土の中に存在し、傷口から菌が体の中に入り感染します。破傷風菌が毒素を出し様々な神経に作用します。口が開きづらい、顎が固くなるといった症状から始まり、歩きづらい、排尿・排便の障害などを経て、最後には全身の筋肉が固くなり、日光や騒音などの刺激で体を弓のように反り返せたり、息ができなくなったりして、亡くなることもあります。

◎ワクチンの副反応

- * 局所反応として、接種部位の発赤・腫れ・しこりなどがみられます。発赤や腫れは数日で自然に治まりますが、小さなしこりが数か月残ることがあります。
- * 全身反応として、発熱、悪寒、倦怠感、下痢、めまい、関節痛などが認められることがありますが、いずれも一時的なもので、通常 2 ～ 3 日で改善します。
- * 2 回以上接種した方は、ときに強い局所反応が現れますが、通常、数日中になくなります。非常にまれですが、重大な副反応としてアナフィラキシー（重いアレルギー症状）が現れることがあります。

R7.4.1

<お問い合わせ先> 伊那市役所健康推進課予防係 電話 0265-78-4111 内線 2332